

投与プロトコール 1コース 21日間 制限なし 《開始時基準 PS:0~2 75歳以下》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートKeep	生理食塩液	250mL	Day 1,8	1時間	
プレメディ	グラニセトン注バッグ 3mg/100mL デキサート注 6.6mg/2mL	1袋 1V	Day 1,8	30分 点滴	
①	ハラヴェン 1.4mg/m ² 生理食塩液	mg 50mL	Day 1,8	全開 点滴	

<使用上の注意点>

【ハラヴェン】

- ◆末梢神経障害:手のしびれ、刺痛、焼けるような痛みが出現することがある。
- ◆生理食塩液に溶解し、0.02mg/mL未満の濃度に希釈しない。

<減量基準>

- ◆ハラヴェン 前サイクルにおいて下記の副作用が発現した場合の減量の目安

減量前の投与量	減量後の投与量
1.4mg/m ²	1.1mg/m ²
1.1mg/m ²	0.7mg/m ²
0.7mg/m ²	投与中止を考慮

Grade 3以上の発熱性好中球減少

Grade 3以上の好中球減少

Grade 4の血小板減少

Grade 3以上の非血液毒性

サイクル内8日目の投与をスキップした場合

- ◆ハラヴェン 腎障害時の減量の目安

Ccr (mL/min)	> 50	30~50	< 30
	1.4mg/m ²	1.1mg/m ²	使用経験なし