

投与プロトコル 1コース 21日間 8コース 《開始時基準 PS:0~3(4) 100歳以下》		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートkeep	生理食塩液	250mL	Day1,2	2時間	
前投薬	アロキシソ注バッグ 0.75mg/50mL デキサソート注 6.6mg/2mL	1袋 1V	Day1	30分 点滴	開始後、薬局に連絡。(連絡後にトレアキシソ混注開始)
前投薬	デキサソート注 6.6mg/2mL 生理食塩液	1V 100mL	Day2	30分 点滴	
①	トレアキシソ 120mg/m ² 注射用水(トレアキシソ100mg(2本)) 生理食塩液	mg 80 mL 250mL	Day1,2	1時間	

<使用上の注意点>

【トレアキシソ】

- ◆医師の注射箋発行後に、前投薬を注射箋のコピーで払い出す。
(看護師は、薬局に前投薬のみを取りに行く。)
- ◆溶解後3時間を経過すると失活するので、前投与薬開始と同時に薬局に混注の依頼をする。
(溶解後3時間以内に投与終了すること。)
- ◆皮膚に発疹がでることがあるので注意する。
- ◆発熱、咳などの症状がでることがあるので注意する。
- ◆血管痛がでることがあるので、注意する。

<調製時の注意点>

- ◆トレアキシソは、他剤との配合は不可。